


Valochol[®] Rapid

Přímý zásah na žlučník

TISKOVÁ ZPRÁVA




Kontaktní osoba: Mgr. Monika Brabcová, Ph.D., PR manager.
E-mail: monika.brabcova@valosun.com, mobil: + 420 731 571 361.

Valochol® Rapid: Přímý zásah na žlučník!

Nejen **při žlučníkových potížích**, ale také při **konzumaci těžších a tučných jídel** oceníte novinku na trhu – doplněk stravy **Valochol® Rapid**, s nímž přichází společnost VALOSUN. Mezi doplňky stravy má hned několik prvenství – jako jediný obsahuje účinnou dávku látky tělu vlastní: **pankreatinu** (ostatní preparáty s jejím obsahem jsou volně prodejné léčiva) a extrakt **boldovníku vonného**, který se v účinné dávce objevuje v doplňku stravy na českém trhu poprvé. Složení navíc doplňuje **lecitin**, který napomáhá dokonalému trávení tuků. Valochol® Rapid se doporučuje všem, kteří trpí žlučníkovými potížemi, žaludeční nevolností, anebo je provázejí problémy po požití neobvyklého a tučného jídla či těžko stravitelných pokrmů. K dostání je ve formě želatinových kapslí, které jsou **obaleny speciálním enterickým potahem pro maximální účinek**. Ten dokáže odolat žaludečním kyselinám, a zajistit tak dokonalé působení přímo v oblasti dvanáctníku a tenkého střeva.

I. ŽLUČNÍK, ŽLUČ A TRÁVENÍ





Žlučník a trávení

Žlučník je dutý orgán o velikosti a tvaru menší hrušky, který slouží ke skladování žluči, jenž vzniká v játrech, v době mezi jídly. Společně s jaterním vývodem je součástí mimojaterních žlučových cest. Odtud je žluč vedena žlučovodem do dvanáctníku (první úsek tenkého střeva) společně s vývodem slinivky břišní.

Žluč a její funkce

Žluč nejen **napomáhá trávení tuků**, ale také s ní z těla **odchází řada škodlivin** (jedy, cholesterol). Obsahuje vodu a řadu látek, které se za normálního stavu rozpouštějí ve vodě. Po požití potravy – zvláště té bohaté na tuky – se vyprazdňuje do tenkého střeva. Tím, že umožňuje rozdělení tuků na malé kapénky, usnadňuje jejich trávení. Malé kapénky totiž společně vytvoří mnohem větší povrch, a díky tomu k nim mají lepší přístup enzymy slinivky břišní, které se na trávení podílejí, tzv. **pankreatin**. Důkladné natrávení tuků je také důležité pro bezproblémové vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K). Řada zažívacích potíží je způsobena právě nedostatkem žluči a žaludečních šťáv (nadýmání, nepříjemný pocit plnosti po jídle, plynatost, snížené vstřebávání nutrietů).



Trávení a působení jednotlivých látek:**II. NOVINKA na žlučník: VALOCHOL® RAPID****Co je Valochol® Rapid?**

• Originální komplex trávicích enzymů a dalších přírodních látek, které **příznivě působí při žlučnickových potížích a při trávení neobvyklých a těžko stravitelných jídel**. Složení a mechanismus působení tohoto preparátu vychází z přirozených biochemických dějů v organismu, při kterých je přítomnost žluči a trávicích enzymů v dostatečném funkčním množství nezbytná. Při přejídání nebo požití obtížně stravitelných jídel (např. s vysokým obsahem tuků) se požadavky organismu na množství trávicích enzymů zvyšují.



• Obsahuje standardizovaný vysoce aktivní **pankreatin** a **extrakt boldovníku vonného** (*Peumus boldus*), které podporují trávení těžkých jídel a pomáhají upravovat sekundární poruchy zažívacího traktu jako je nadýmání, pocit plnosti a jiné střevní a dyspeptické potíže.¹⁻⁶⁾ Pankreatin se získává z vepřových pankreatů. Blízká příbuznost složení vepřového a lidského pankreatinu zajišťuje vysokou účinnost a dobrou snášenlivost. Pankreatin spolu s extraktem boldovníku a lecitinem **je plněn do celulózových tobolek** zajišťujících bezpečný průchod žaludkem do dvanáctníku, kde dochází k rozvoji plné aktivity účinných látek.

Složení:

Pankreatin: lipáza >13500 PH.Eur.u/g amyláza >13000 PH.Eur.u/g proteáza >760 PH.Eur.u/mg	200 mg
Boldovník vonný <i>Peumus boldus</i> (standardizovaný 0,05% extrakt)	20 mg
Lecitin	150 mg
Pomocné látky: celulóza E460	

Jak Valochol® Rapid pomáhá?

Složky, kterou obsahuje přípravek Valochol® Rapid, přirozeným způsobem **napomáhají trávení těžko stravitelných, tučných nebo neobvyklých jídel**. Pomáhají také upravovat žlučnickové potíže a podporují funkci žlučníku.


Pomáhá při:**1. Trávení těžších a tučných jídel**

Po požití potravy se do tenkého střeva vyplavuje žluč, jejíž produkci stimulují aktivní látky obsaženého **boldovníku vonného**. Tím urychlují trávicí proces.⁵⁻⁶⁾ Jeho extrakt usnadňuje trávení výše zmíněným způsobem: umožňuje jejich rozdělení na malé kapénky, ke kterým mají mnohem lepší přístup trávicí enzymy (pankreatin), které se na vlastním trávení podílejí. Vykazuje také silné antioxidační účinky a působí protektivně vůči buňkám.

Pankreatin je vylučován slinivkou břišní po jídle. Pankreatické enzymy vyvinou svoji plnou aktivitu v tenkém střevě během 30 až 45 minut po požití.¹⁻⁴⁾ Produkty pankreatického štěpení jsou následně tělem snadno vstřebávány.

Pankreatin je směsí enzymů lipázy, proteázy a amylázy.

- Amyláza se v lidském těle nachází ve slinách a trávicích šťávách slinivky a pomáhá trávit složené cukry na jednoduché, monosacharidy.
- Proteázy se nacházejí v žaludku a v sekretech slinivky břišní a usnadňují štěpení bílkovin na aminokyseliny.
- Lipáza odbourává potravu bohatou na tuky. Tuky štěpí na mastné kyseliny a glycerol.



• Žlučníkových potíží

Extrakt **boldovníku** obsahuje mnoho biologicky aktivních látek, které plní zklidňující a antibakteriální funkci ve žlučových cestách. Jeho výhodou je, že se velice rychle vstřebává – za 15 až 30 minut po požití. Působí také ochranně vůči játrům.⁵⁻⁶⁾ Obsažený **lecitin** vykazuje lipotropní účinek, pomáhá udržovat správnou hladinu cholesterolu v organismu a podílí se na zabránění vzniku usazenin v cévách a vzniku cholesterolových kamenů ve žluči.



Jak se Valochol® Rapid užívá?

- Užívá se **1–3 tobolky denně** při jídle nebo po jídle, zapít dostatečným množstvím tekutiny. Počet současně užitých tobolek závisí na míře pociťovaných obtíží, druhu jídla a na známém či předpokládaném stupni možných trávicích potíží.
- Valochol® Rapid je určen k užití **jak při náhlých nevolnostech, tak při jejich předcházení při nepravidelné, tučné nebo jinak obtížně stravitelné stravě.** Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
- Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Při pravidelném užívání používejte přípravek nejdéle po dobu 4 týdnů. Osoby s onemocněním jater, zánětem slinivky břišní a žlučníkovými kameny by užívání přípravku měli konzultovat s lékařem.

Reference:

- 1) Ferrone, M.; Raimondo, M.; Scolapio, J.S.: Pancreatic enzyme pharmacotherapy, Pharmacotherapy, 2007, 27(6): 910-20
- 2) Keller, J.; Layer, P.: Pancreatic Enzyme Supplementation Therapy, Curr Treat Options Gastroenterol, 2003, 6(5): 369-374
- 3) Layer, P.; Keller, J.: Pancreatic enzymes: secretion and luminal nutrient digestion in health and disease, J Clin Gastroenterol, 1999, 28(1): 3-10
- 4) Layer, P.; Keller, J.; Lankisch, P.G.: Pancreatic enzyme replacement therapy, Curr Gastroenterol Rep, 2001, 3(2): 101-8
- 5) Boldi folium, ESCOP Monographs, Second edition, 2003: 52-57
- 6) Boldo, British Herbal Pharmacopoeia (BHP), 1996, Exeter, U.K.: British Herbal Medicine Association, P43-44

Pro bližší informace kontaktujte společnost **VALOSUN a.s.**

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Brabcová, Ph.D., PR Manager.

E-mail: monika.brabcova@valosun.com, mobil: +420 731 571 361.

VALOSUN a. s.
Kytnerova 403/5
621 00 Brno
www.valosun.com